LES MATINÉES DE LA RÉHAB

REMÉDIATION COGNITIVE

Oriane GRODZKI, psychologue spécialisée en neuropsychologie

Association SMA (Santé Mentale Alsace)

SAVS-SAMSAH

56 grand rue - 68100 Mulhouse

5 MAI 2022

PARTIE 1. ASPECTS THÉORIQUES

TERMINOLOGIE

Stimulation cognitive

Remédiation
cognitive

De quoi s'agit-il ?

Rééducation

Revalidation
cognitive

Réhabilitation

QUEL TERME POUR QUELLE APPROCHE ?

QUEL TERME POUR QUELLE APPROCHE ?

Réhabilitation

Ensemble des interventions neuro-psycho-sociales multidisciplinaires qui visent à aider la personne à mieux vivre avec la maladie et à être autonome (vie quotidienne, professionnelle, sociale)

QUEL TERME POUR QUELLE APPROCHE ?

Réhabilitation

Ensemble des interventions neuro-psycho-sociales multidisciplinaires qui visent à aider la personne à mieux vivre avec la maladie et à être autonome (vie quotidienne, professionnelle, sociale)

QUEL TERME POUR QUELLE APPROCHE ?

Réhabilitation

Ensemble des interventions neuro-psycho-sociales multidisciplinaires qui visent à aider la personne à mieux vivre avec la maladie et à être autonome (vie quotidienne, professionnelle, sociale)

Revalidation
cognitive

Remédiation
cognitive

**Interventions ciblant le travail des
fonctions cognitives**

**Elles visent à l'amélioration du
fonctionnement cognitif**

QUEL TERME POUR QUELLE APPROCHE ?

Réhabilitation

Ensemble des interventions neuro-psycho-sociales multidisciplinaires qui visent à aider la personne à mieux vivre avec la maladie et à être autonome (vie quotidienne, professionnelle, sociale)

Revalidation
cognitive

Remédiation
cognitive

**Interventions ciblant le travail des
fonctions cognitives**

**Elles visent à l'amélioration du
fonctionnement cognitif**

Stimulation cognitive :

toute activité qui
sollicite les fonctions
cognitives

n'améliore pas le
fonctionnement Mais
participe à son maintien
dans une certaine
mesure

DANS QUELLE CONTEXTE INTERVIENT-ELLE ?

.....

LA NEUROPSYCHOLOGIE

Etude du lien en fonctionnement cérébral et comportement

LA NEUROPSYCHOLOGIE

Etude du lien en fonctionnement cérébral et comportement

Déterminer le **profil cognitif** de la personne :

ses ressources

ses fragilités

LA NEUROPSYCHOLOGIE

Etude du lien en fonctionnement cérébral et comportement

Déterminer le **profil cognitif** de la personne :

ses ressources

ses fragilités

Évaluation neuropsychologique à l'aide de tests validés scientifiquement :
permet de cibler le/les processus déficitaire(s) le plus précisément possible

LA NEUROPSYCHOLOGIE

Etude du lien en fonctionnement cérébral et comportement

Déterminer le **profil cognitif** de la personne :

ses ressources

ses fragilités

Évaluation neuropsychologique à l'aide de tests validés scientifiquement :
permet de cibler le/les processus déficitaire(s) le plus précisément possible

Importance des modèles théoriques des différentes fonctions cognitives
dans la compréhension des difficultés de la personne

UN PETIT DÉTOUR : QUE SONT LES FONCTIONS COGNITIVES ?

UN PETIT DÉTOUR : QUE SONT LES FONCTIONS COGNITIVES ?

DEUX GRANDS DOMAINES

UN PETIT DÉTOUR : QUE SONT LES FONCTIONS COGNITIVES ?

DEUX GRANDS DOMAINES

NEUROCOGNITIF

- FONCTIONS EXÉCUTIVES OU FONCTIONS DE CONTRÔLE
- ATTENTION
- MÉMOIRE
- LANGAGE
- PRAXIES

UN PETIT DÉTOUR : QUE SONT LES FONCTIONS COGNITIVES ?

DEUX GRANDS DOMAINES

NEUROCOGNITIF

- FONCTIONS EXÉCUTIVES OU FONCTIONS DE CONTRÔLE
- ATTENTION
- MÉMOIRE
- LANGAGE
- PRAXIES

COGNITION SOCIALE

- PERCEPTION DES ÉMOTIONS
- THÉORIE DE L'ESPRIT
- EMPATHIE

UN PETIT DÉTOUR : QUE SONT LES FONCTIONS COGNITIVES ?

DEUX GRANDS DOMAINES

NEUROCOGNITIF

- FONCTIONS EXÉCUTIVES OU FONCTIONS DE CONTRÔLE
- ATTENTION
- MÉMOIRE
- LANGAGE
- PRAXIES

COGNITION SOCIALE

- PERCEPTION DES ÉMOTIONS
- THÉORIE DE L'ESPRIT
- EMPATHIE

COGNITION CHAUDE

=

Implication des phénomènes affectifs (émotions, humeur...)

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES : LE CHEF D'ORCHESTRE

**source : google image*

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES : LE CHEF D'ORCHESTRE

Ce sont des capacités de contrôle
qui vont intervenir :

**source : google image*

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES : LE CHEF D'ORCHESTRE

Ce sont des **capacités de contrôle**
qui vont intervenir :

- lorsque les routines ne permettent plus de faire correctement une activité

**source : google image*

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES : LE CHEF D'ORCHESTRE

Ce sont des capacités de contrôle
qui vont intervenir :

- lorsque les routines ne permettent plus de faire correctement une activité
- face à la nouveauté

**source : google image*

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES : LE CHEF D'ORCHESTRE

Ce sont des **capacités de contrôle** qui vont intervenir :

- lorsque les routines ne permettent plus de faire correctement une activité
- face à la nouveauté
- pour structurer les informations qui nous parviennent

**source : google image*

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES : LE CHEF D'ORCHESTRE

Ce sont des **capacités de contrôle** qui vont intervenir :

- lorsque les routines ne permettent plus de faire correctement une activité
- face à la nouveauté
- pour structurer les informations qui nous parviennent
- faire preuve de souplesse

**source : google image*

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES : LE CHEF D'ORCHESTRE

Ce sont des **capacités de contrôle** qui vont intervenir :

- lorsque les routines ne permettent plus de faire correctement une activité
- face à la nouveauté
- pour structurer les informations qui nous parviennent
- faire preuve de souplesse
- s'engager spontanément dans une activité : faire preuve d'initiative

**source : google image*

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES : LE CHEF D'ORCHESTRE

Ce sont des **capacités de contrôle** qui vont intervenir :

- lorsque les routines ne permettent plus de faire correctement une activité
- face à la nouveauté
- pour structurer les informations qui nous parviennent
- faire preuve de souplesse
- s'engager spontanément dans une activité : faire preuve d'initiative
- pour prendre des décisions et faire des choix les plus adaptés

**source : google image*

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES : LE CHEF D'ORCHESTRE

Ce sont des **capacités de contrôle** qui vont intervenir :

- lorsque les routines ne permettent plus de faire correctement une activité
- face à la nouveauté
- pour structurer les informations qui nous parviennent
- faire preuve de souplesse
- s'engager spontanément dans une activité : faire preuve d'initiative
- pour prendre des décisions et faire des choix les plus adaptés

**source : google image*

Ces aptitudes cognitives permettent de **s'adapter** efficacement à son environnement et d'**orienter ses actions vers des buts**

.....

LES ATTENTIONS :

Alerte phasique

permet de réagir a des stimulations externes et de se préparer à l'arrivée d'un événement prévisible à venir

LES ATTENTIONS :

Alerte phasique

permet de réagir a des stimulations externes et de se préparer à l'arrivée d'un événement prévisible à venir

Orientation de l'attention

permet de porter son attention sur différents endroits de l'espace

LES ATTENTIONS :

Alerte phasique

permet de réagir a des stimulations externes et de se préparer à l'arrivée d'un événement prévisible à venir

Orientation de l'attention

permet de porter son attention sur différents endroits de l'espace

Focalisation attentionnelle

permet de porter son attention sur une information spécifique sans se laisser distraire par l'ensemble des informations qui l'accompagnent

LES ATTENTIONS :

Alerte phasique

permet de réagir a des stimulations externes et de se préparer à l'arrivée d'un événement prévisible à venir

Orientation de l'attention

permet de porter son attention sur différents endroits de l'espace

Focalisation attentionnelle

permet de porter son attention sur une information spécifique sans se laisser distraire par l'ensemble des informations qui l'accompagnent

Attention soutenue : concentration

capacité à maintenir efficacement son attention en continu jusqu'à la fin de l'activité

LES ATTENTIONS :

Alerte phasique

permet de réagir a des stimulations externes et de se préparer à l'arrivée d'un événement prévisible à venir

Orientation de l'attention

permet de porter son attention sur différents endroits de l'espace

Focalisation attentionnelle

permet de porter son attention sur une information spécifique sans se laisser distraire par l'ensemble des informations qui l'accompagnent

Attention soutenue : concentration

capacité à maintenir efficacement son attention en continu jusqu'à la fin de l'activité

Attention divisée

permet de partager son attention sur deux activités en même temps

LES MÉMOIRES

LES MÉMOIRES

Mode d'expression de la mémoire :
implicite (non intentionnel) / explicite
(intentionnel)

LES MÉMOIRES

Mode d'expression de la mémoire :
implicite (non intentionnel) / explicite
(intentionnel)

Des mémoires en fonction de la modalité
sensorielle : visuelle, auditive...

LES MÉMOIRES

Mode d'expression de la mémoire :
implicite (non intentionnel) / explicite
(intentionnel)

Des mémoires en fonction de la modalité
sensorielle : visuelle, auditive...

Mémoire à court-terme (mémoire immédiate)

permet de retenir temporairement une quantité limité d'informations en
tête

LES MÉMOIRES

Mode d'expression de la mémoire :
implicite (non intentionnel) / explicite
(intentionnel)

Des mémoires en fonction de la modalité
sensorielle : visuelle, auditive...

Mémoire à court-terme (mémoire immédiate)

permet de retenir temporairement une quantité limité d'informations en
tête

Mémoire de travail

permet de travailler de tête les informations en mémoire immédiate afin de
satisfaire un but spécifique

LES MÉMOIRES

Mode d'expression de la mémoire :
implicite (non intentionnel) / explicite
(intentionnel)

Des mémoires en fonction de la modalité
sensorielle : visuelle, auditive...

Mémoire à court-terme (mémoire immédiate)

permet de retenir temporairement une quantité limité d'informations en
tête

Mémoire de travail

permet de travailler de tête les informations en mémoire immédiate afin de
satisfaire un but spécifique

Mémoire à long-terme

permet de retenir une quantité illimité d'informations en mémoire de
manière durable

Mémoire à court-terme (mémoire immédiate)

permet de retenir temporairement une quantité limité d'informations en tête

Mémoire de travail

permet de travailler de tête les informations en mémoire immédiate afin de satisfaire un but spécifique

Administrateur central

- **gérer la charge mentale**
- **mettre à jour les informations**
- **résister aux interférences**

Mémoire à court-terme (mémoire immédiate)

permet de retenir temporairement une quantité limité d'informations en tête

Mémoire de travail

permet de travailler de tête les informations en mémoire immédiate afin de satisfaire un but spécifique

Mémoire à long-terme

permet de retenir une quantité illimité d'informations en mémoire de manière durable

Mémoire à long-terme

permet de retenir une **quantité illimitée** d'informations en mémoire de manière **durable**

Mémoire épisodique

« renvoie à la capacité de se souvenir des événements spécifiques qui ont été personnellement vécus dans un contexte spatial et temporel particulier »

Mémoire à long-terme

permet de retenir une **quantité illimitée** d'informations en mémoire de manière **durable**

Mémoire épisodique

« renvoie à la capacité de se souvenir des événements spécifiques qui ont été personnellement vécus dans un contexte spatial et temporel particulier »

Mémoire autobiographique

« concerne l'ensemble des connaissances sur ce que nous sommes et avons vécu, à la fois les souvenirs épisodiques, mais aussi les connaissances sémantiques personnelles »

Mémoire à long-terme

permet de retenir une quantité illimitée d'informations en mémoire de manière durable

Mémoire épisodique

« renvoie à la capacité de se souvenir des événements spécifiques qui ont été personnellement vécus dans un contexte spatial et temporel particulier »

Mémoire autobiographique

« concerne l'ensemble des connaissances sur ce que nous sommes et avons vécu, à la fois les souvenirs épisodiques, mais aussi les connaissances sémantiques personnelles »

Mémoire sémantique

« connaissances représentées en mémoire à long terme sous forme de concepts : p. ex une pomme : est ronde, le plus souvent rouge, un gout sucré, peut être mangée en tarte »

Mémoire à long-terme

permet de retenir une quantité illimitée d'informations en mémoire de manière durable

Mémoire épisodique

« renvoie à la capacité de se souvenir des événements spécifiques qui ont été personnellement vécus dans un contexte spatial et temporel particulier »

Mémoire autobiographique

« concerne l'ensemble des connaissances sur ce que nous sommes et avons vécu, à la fois les souvenirs épisodiques, mais aussi les connaissances sémantiques personnelles »

Mémoire sémantique

« connaissances représentées en mémoire à long terme sous forme de concepts : p. ex une pomme : est ronde, le plus souvent rouge, un gout sucré, peut être mangée en tarte »

Mémoire procédurale

« permet d'apprendre des habiletés comme utiliser un ordinateur... »

Attention sociale : perception des indices sociaux

Attention sociale : perception des indices sociaux

- parties informatives : visage, yeux, voix...
- ce à quoi fait attention la personne : attention conjointe

Attention sociale : perception des indices sociaux

- parties informatives : visage, yeux, voix...
- ce à quoi fait attention la personne : attention conjointe

Attribution sociale : Inférences d'états mentaux transitoires d'une personne

Attention sociale : perception des indices sociaux

- parties informatives : visage, yeux, voix...
- ce à quoi fait attention la personne : attention conjointe

Attribution sociale : Inférences d'états mentaux transitoires d'une personne

- décodage bas niveau de l'état mental** : expressions du visage, expression corporelle, raisonnement motrice, contagion émotionnelle

Attention sociale : perception des indices sociaux

- parties informatives : visage, yeux, voix...
- ce à quoi fait attention la personne : attention conjointe

Attribution sociale : Inférences d'états mentaux transitoires d'une personne

- décodage bas niveau de l'état mental** : expressions du visage, expression corporelle, raisonnement motrice, contagion émotionnelle
- prédiction de l'état mental** : Théorie de l'esprit (ToM)
 - connaissances conceptuelles sur les états mentaux
 - prise de perspective : raisonnement sur nos propres états mentaux et ceux des autres

DEFICITS COGNITIFS

Récurrents

Récurrents

Touche diverses pathologies :

Récurrents

Touche diverses pathologies :

- neurologiques

Récurrents

Touche diverses pathologies :

- neurologiques
- psychiatriques

Récurrents

Touche diverses pathologies :

- neurologiques
- psychiatriques

Peuvent **précéder** ou **être induits** par l'émergence d'une pathologie

Récurrents

Touche diverses pathologies :

- neurologiques
- psychiatriques

Peuvent **précéder** ou **être induits** par l'émergence d'une pathologie

Peuvent être **transitoires** ou **permanents**

Récurrents

Touche diverses pathologies :

- neurologiques
- psychiatriques

Peuvent **précéder** ou **être induits** par l'émergence d'une pathologie

Peuvent être **transitoires** ou **permanents**

Sont d'intensité variable

Récurrents

Touche diverses pathologies :

- neurologiques
- psychiatriques

Peuvent **précéder** ou **être induits** par l'émergence d'une pathologie

Peuvent être **transitoires** ou **permanents**

Sont d'intensité variable

Récurrents

Touche diverses pathologies :

- neurologiques
- psychiatriques

Peuvent **précéder** ou **être induits** par l'émergence d'une pathologie

Peuvent être **transitoires** ou **permanents**

Sont d'intensité variable

Les plus fréquemment observés dans le cadre de ma pratique :

Récurrents

Touche diverses pathologies :

- neurologiques
- psychiatriques

Peuvent **précéder** ou **être induits** par l'émergence d'une pathologie

Peuvent être **transitoires** ou **permanents**

Sont d'intensité variable

Les plus fréquemment observés dans le cadre de ma pratique :

- troubles des fonctions exécutives

Récurrents

Touche diverses pathologies :

- neurologiques
- psychiatriques

Peuvent **précéder** ou **être induits** par l'émergence d'une pathologie

Peuvent être **transitoires** ou **permanents**

Sont d'intensité variable

Les plus fréquemment observés dans le cadre de ma pratique :

- troubles des fonctions exécutives
- troubles attentionnels

Récurrents

Touche diverses pathologies :

- neurologiques
- psychiatriques

Peuvent **précéder** ou **être induits** par l'émergence d'une pathologie

Peuvent être **transitoires** ou **permanents**

Sont d'intensité variable

Les plus fréquemment observés dans le cadre de ma pratique :

- troubles des fonctions exécutives
- troubles attentionnels
- troubles de la mémoire de travail

Récurrents

Touche diverses pathologies :

- neurologiques
- psychiatriques

Peuvent **précéder** ou **être induits** par l'émergence d'une pathologie

Peuvent être **transitoires** ou **permanents**

Sont d'intensité variable

Les plus fréquemment observés dans le cadre de ma pratique :

- troubles des fonctions exécutives
- troubles attentionnels
- troubles de la mémoire de travail
- déficits de cognition sociale

REVALIDATION COGNITIVE

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

Objectifs de la revalidation :

évaluation de la situation concrète de vie de la personne

travailler sur le handicap cognitif qui résulte d'un déficit cognitif

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

Objectifs de la revalidation :

évaluation de la situation concrète de vie de la personne

travailler sur le handicap cognitif qui résulte d'un déficit cognitif

« Distinction entre déficit - incapacité - handicap

- Déficit : dysfonctionnement des mécanismes psychologiques
- Incapacité : conséquences du déficit dans des tâches spécifiques
- Handicap : difficultés d'adaptation du patient dans sa vie privée et sociale »

REVALIDATION COGNITIVE

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

Différentes stratégies :

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

Différentes stratégies :

- **Restauration** : intervention visant à rétablir la fonction à son niveau de capacité antérieur

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

Différentes stratégies :

- **Restauration** : intervention visant à rétablir la fonction à son niveau de capacité antérieur
- **Réorganisation** : intervention de composantes différentes de traitement

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

Différentes stratégies :

- **Restauration** : intervention visant à rétablir la fonction à son niveau de capacité antérieur
- **Réorganisation** : intervention de composantes différentes de traitement
- **Exploitation des fonctions intactes**

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

Différentes stratégies :

- **Restauration** : intervention visant à rétablir la fonction à son niveau de capacité antérieur
- **Réorganisation** : intervention de composantes différentes de traitement
- **Exploitation des fonctions intactes**
- **Aménagement** des conditions d'exercice de la fonction

DIFFÉRENTS ET NOMBREUX OUTILS :

Programmes d'entraînement informatisés

RECOS

COGMED

...

DIFFÉRENTS ET NOMBREUX OUTILS :

Programmes d'entraînement informatisés

RECOS

COGMED

...

Programmes d'entraînement non informatisés

GMT

IPT partie neurocognitive

...

DIFFÉRENTS ET NOMBREUX Outils :

Programmes d'entraînement informatisés

RECOS

COGMED

...

Programmes d'entraînement non informatisés

GMT

IPT partie neurocognitive

...

Programmes compensatoires d'aménagement de l'environnement

CAT

Aides externes

...

**Programmes
compensatoires
d'aménagement de
l'environnement**

CAT

Aides externes

...

Utiliser un outil de
remédiation cognitive
ne signifie pas faire
de la remédiation
cognitive

Utiliser un outil de
remédiation cognitive
ne signifie pas faire
de la remédiation
cognitive

REVALIDATION COGNITIVE

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

REVALIDATION COGNITIVE

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

La remédiation / revalidation cognitive : démarche qui implique un ensemble d'étapes

- évaluation neuropsych
- évaluation du retentissement fonctionnel
- évaluation du handicap

REVALIDATION COGNITIVE

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

La remédiation / revalidation cognitive : démarche qui implique un ensemble d'étapes

- évaluation neuropsych
- évaluation du retentissement fonctionnel
- évaluation du handicap

- le retentissement du déficit cognitif
- des ressources mises en place par la personne
- de ses besoins / de l'utilité
- de l'importance qu'elle donne au travail des difficultés observées

REVALIDATION COGNITIVE

« Approche focalisée sur des buts précis dans la vie quotidienne, établis en partenariat par le patient lui-même, ses proches et le clinicien » Seron & Van der Linden (2016)

La remédiation / revalidation cognitive : démarche qui implique un ensemble d'étapes

REVALIDATION COGNITIVE

LES AIDES EXTERNES/ AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT

Schizophrenia Bulletin vol. 46 no. 4 pp. 869–883, 2020
doi:10.1093/schbul/sbz134
Advance Access publication 13 February 2020

Compensatory Interventions for Cognitive Impairments in Psychosis: A Systematic Review and Meta-Analysis

Kelly Allott^{*1,2}, Kristi van-der-EL^{1,2}, Shayden Bryce^{1,2}, Emma M. Parrish³, Susan R. McGurk⁴, Sarah Hetrick^{1,2,5}, Christopher R. Bowie⁶, Sean Kidd⁷, Matthew Hamilton^{1,2}, Eoin Killackey^{1,2}, and Dawn Velligan⁸

¹Orygen, Park
University/Un
CA; ⁴Departm
Psychological
Ontario, ON,
University of

*To whom cor
e-mail: kelly.allott@utoronto.ca

Schizophrenia Research: Cognition 19 (2020) 100157

ELSEVIER

Contents lists available at [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com)

Schizophrenia Research: Cognition

journal homepage: www.elsevier.com/locate/scog

Research paper

A comparison of compensatory and restorative cognitive interventions in early psychosis

Sean A. Kidd^{a,*}, Yarissa Herman^b, Gursharan Virdee^b, Christopher R. Bowie^c, Dawn Velligan^d, Christina Plagiannakos^e, Aristotle Voineskos^f

^a University of Toronto Department of Psych

^b Toronto Centre for Addiction and Mental

^c Queens University, Department of Psychol

^d University of Texas at San Antonio, Depa

^e Toronto Centre for Addiction and Mental

^f University of Toronto Department of Psych

The American Journal of

Psychiatry

[Current Issue](#) | [Archive](#) | [About](#) | [Residents' Journal](#) | [AJP In Advance](#) | [Podcast](#) | [CME](#) | [Author Resources](#) | [Author](#)

[Back to table of contents](#)

[Previous Article](#)

[Next Article](#)

Perspectives

[Full Access](#)

A Meta-Analysis of Cognitive Remediation for Schizophrenia: Methodology and Effect Sizes

Til Wykes [✉](mailto:tyw@ucl.ac.uk), Ph.D., Vyv Huddy, Ph.D., Caroline Cellard, Ph.D., Susan R. McGurk, Ph.D., and Pál Czobor, Ph.D.

Published Online: 1 May 2011 | <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.10060855>

REVALIDATION COGNITIVE

LES AIDES EXTERNES/ AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT

Schizophrenia Bulletin vol. 46 no. 4 pp. 869–883, 2020
doi:10.1093/schbul/sbz134
Advance Access publication 13 February 2020

Compensatory Interventions for Cognitive Impairments in Psychosis: A Systematic Review and Meta-Analysis

Kelly Allott^{*1,2}, Kristi van-der-EL^{1,2}, Shayden Bryce^{1,2}, Emma M. Parrish³, Susan R. McGurk⁴, Sarah Hetrick^{1,2,5}, Christopher R. Bowie⁶, Sean Kidd⁷, Matthew Hamilton^{1,2}, Eoin Killackey^{1,2}, and Dawn Velligan⁸

¹Orygen, Parkville, Victoria, Australia; ²University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australia; ³Department of Psychology, University of Toronto, Toronto, Ontario, ON, Canada; ⁴Department of Psychological Science, University of California, San Diego, La Jolla, CA; ⁵Department of Psychology, University of Toronto, Toronto, Ontario, ON, Canada; ⁶Department of Psychology, University of Toronto, Toronto, Ontario, ON, Canada; ⁷Department of Psychology, University of Toronto, Toronto, Ontario, ON, Canada; ⁸Department of Psychology, University of Toronto, Toronto, Ontario, ON, Canada

*To whom correspondence should be addressed. E-mail: kelly.allott@utoronto.ca

ELSEVIER

Schizophrenia Research: Cognition 19 (2020)

Contents lists available at ScienceDirect

Schizophrenia Research: Cognition

journal homepage: www.elsevier.com/locate/SchResCognition

Research paper

A comparison of compensatory and restorative cognitive remediation in early psychosis

Sean A. Kidd^{a,*}, Yarissa Herman^b, Gursharan Virdee^b, Christopher R. Bowie^c, Dawn Velligan^d, Christina Plagiannakos^e, Aristotle Voineskos^f

^a University of Toronto Department of Psychology

^b Toronto Centre for Addiction and Mental Health

^c Queens University, Department of Psychology

^d University of Texas at San Antonio, Department of Psychology

^e Toronto Centre for Addiction and Mental Health

^f University of Toronto Department of Psychology

The American Journal of
Psychiatry

Current Issue | Archive

[Back to table of contents](#)

Perspectives

A Meta-Analysis of Cognitive Remediation for Schizophrenia: Methodology and Effect Sizes

Til Wykes , Ph.D., Vyv Huddy, Ph.D., Caroline Cellard, Ph.D., Susan R. McGurk, Ph.D., and Pál Czobor, Ph.D.

Published Online: 1 May 2011 | <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.10060855>

Retentissement positif sur le fonctionnement de la personne :

- capacités
- adhésion au traitement
- emploi
- fonctionnement global
- psychosocial

Effets équivalents à ceux des programmes d'entraînement informatisés

Boost les effets d'autres interventions en réhabilitation cognitive

Effets durables mais qui nécessitent un temps d'assimilation (en semaines)

LES AIDES EXTERNES

LES AIDES EXTERNES

Schizophrenia Research: Cognition 19 (2020) 100157

Contents lists available at ScienceDirect

ELSEVIER

Schizophrenia Research: Cognition

journal homepage: www.elsevier.com/locate/scog

Research paper

A comparison of compensatory and restorative cognitive interventions in early psychosis

Sean A. Kidd^{a,*}, Yarissa Herman^b, Gursharan Virdee^b, Christina Plagiannakos^e, Aristotle Voineskos^f

^a University of Toronto Department of Psychiatry, Canada

^b Toronto Centre for Addiction and Mental Health, CAMH, 1001 Queen St. W., Toronto, Ontario, Canada

^c Queens University, Department of Psychology, 219 Craine Hall, Kingston K7L 3N6, Ontario, Canada

^d University of Texas at San Antonio, Department of Psychiatry, 7526 Louis Pasteur Dr, San Antonio, TX 78229, USA

^e Toronto Centre for Addiction and Mental Health, Canada

^f University of Toronto Department of Psychiatry, CAMH, 250 College St., Toronto M5T1R8, Ontario, Canada

CAT et l'approche informatisée (associée à des stratégies) ont des effets comparables lorsque les interventions se basent sur des objectifs précis centrés sur des activités du quotidien

LES AIDES EXTERNES

Schizophrenia Research: Cognition 19 (2020) 100157

Contents lists available at ScienceDirect

ELSEVIER

Schizophrenia Research: Cognition

journal homepage: www.elsevier.com/locate/scog

Research paper

A comparison of compensatory and restorative cognitive interventions in early psychosis

Sean A. Kidd^{a,*}, Yarissa Herman^b, Gursharan Virdee^b, Christina Plagiannakos^e, Aristotle Voineskos^f

^a University of Toronto Department of Psychiatry, Canada

^b Toronto Centre for Addiction and Mental Health, CAMH, 1001 Queen St. W., Toronto, Ontario, Canada

^c Queens University, Department of Psychology, 219 Craine Hall, Kingston K7L 3N6, Ontario, Canada

^d University of Texas at San Antonio, Department of Psychiatry, 7526 Louis Pasteur Dr, San Antonio, TX 78229, USA

^e Toronto Centre for Addiction and Mental Health, Canada

^f University of Toronto Department of Psychiatry, CAMH, 250 College St., Toronto M5T1R8, Ontario, Canada

CAT et l'approche informatisée (associée à des stratégies) ont des effets comparables lorsque les interventions se **basent sur des objectifs précis centrés sur des activités du quotidien**

The American Journal of

Psychiatry

Current Issue | Archive | About | Residents' Journal | AJP In Advance | Podcast | CME | Author Resources | Author

[Back to table of contents](#)

Perspectives

A Meta-Analysis of Cognitive Remediation for Schizophrenia: Methodology and Effect Sizes

Til Wykes, Ph.D., Vyv Huddy, Ph.D., Caroline Cellard, Ph.D., Susan

Published Online: 1 May 2011 | <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.10060855>

A noter : l'approche informatisée a des effets bénéfiques lorsqu'elle est associée à la mise en place de stratégies (repérage de la situation pb, comment mettre en place la compétence travaillée...) comparativement à un travail de réentraînement seul (sans stratégies associées)

Article

Randomized Controlled Trial of the Use of Compensatory Strategies to Enhance Adaptive Functioning in Outpatients With Schizophrenia

Dawn I. Velligan, Ph.D.

C. Christine Bow-Thomas, Ph.D.

Cindy Huntzinger, B.A.

Janice Ritch, M.A.

Natalie Ledbetter, M.A.

Thomas J. Prihoda, Ph.D.

Alexander L. Miller, M.D.

Objective: Cognitive adaptation training is a novel psychosocial treatment approach designed to improve adaptive functioning by using compensatory strategies in the home or work environment to bypass the cognitive deficits associated with schizophrenia. The authors tested the effect of cognitive adaptation training on level of adaptive functioning in outpatients with schizophrenia.

Method: Forty-five patients with DSM-IV schizophrenia or schizoaffective disorder were randomly assigned for 9 months to one of three treatment conditions: 1) standard medication follow-up, 2) standard medication follow-up plus cognitive adaptation training, and 3) standard medication follow-up plus a condition designed to control for therapist time and provide environmental changes unrelated to cognitive deficits. Comprehensive assessments

were conducted every 3 months by raters who were blind to treatment condition.

Results: Significant differences were found between the three treatment groups in levels of psychotic symptoms, motivation, and global functioning at the end of the 9-month study period. Patients in the cognitive adaptation training group overall had higher levels of improvement, compared with those in the remaining treatment conditions. In addition, the three groups had significantly different relapse rates over the 9-month study: 13% for the cognitive adaptation training group, 69% for the group in which therapist time and environmental changes were controlled, and 33% for the group who received standard follow-up only.

Conclusions: Compensatory strategies may improve outcomes for patients with schizophrenia.

(Am J Psychiatry 2000; 157:1317-1323)

Article

Principes : Use of Compensatory Strategies to Enhance Adaptive Functioning in Outpatients With Schizophrenia

Dawn I. Velligan, Ph.D.

C. Christine Bow-Thomas, Ph.D.

Cindy Huntzinger, B.A.

Janice Ritch, M.A.

Natalie Ledbetter, M.A.

Thomas J. Prihoda, Ph.D.

Alexander L. Miller, M.D.

Objective: Cognitive adaptation training is a novel psychosocial treatment approach designed to improve adaptive functioning by using compensatory strategies in the home or work environment to bypass the cognitive deficits associated with schizophrenia. The authors tested the effect of cognitive adaptation training on level of adaptive functioning in outpatients with schizophrenia.

Method: Forty-five patients with DSM-IV schizophrenia or schizoaffective disorder were randomly assigned for 9 months to one of three treatment conditions: 1) standard medication follow-up, 2) standard medication follow-up plus cognitive adaptation training, and 3) standard medication follow-up plus a condition designed to control for therapist time and provide environmental changes unrelated to cognitive deficits. Comprehensive assessments

were conducted every 3 months by raters who were blind to treatment condition.

Results: Significant differences were found between the three treatment groups in levels of psychotic symptoms, motivation, and global functioning at the end of the 9-month study period. Patients in the cognitive adaptation training group overall had higher levels of improvement, compared with those in the remaining treatment conditions. In addition, the three groups had significantly different relapse rates over the 9-month study: 13% for the cognitive adaptation training group, 69% for the group in which therapist time and environmental changes were controlled, and 33% for the group who received standard follow-up only.

Conclusions: Compensatory strategies may improve outcomes for patients with schizophrenia.

(Am J Psychiatry 2000; 157:1317-1323)

Article

Randomized Controlled Trial of the Use of Compensatory Strategies to Enhance Adaptive Functioning in Outpatients With Schizophrenia

Dawn I. Velligan, Ph.D.

C. Christine Bow-Thomas, Ph.D.

Cindy Huntzinger, B.A.

Janice Ritch, M.A.

Natalie Ledbetter, M.A.

Thomas J. Prihoda, Ph.D.

Alexander L. Miller, M.D.

Objective: Cognitive adaptation training is a novel psychosocial treatment approach designed to improve adaptive functioning by using compensatory strategies in the home or work environment to bypass the cognitive deficits associated with schizophrenia. The authors tested the effect of cognitive adaptation training on level of adaptive functioning in outpatients with schizophrenia.

Method: Forty-five patients with DSM-IV schizophrenia or schizoaffective disorder were randomly assigned for 9 months to one of three treatment conditions: 1) standard medication follow-up, 2) standard medication follow-up plus cognitive adaptation training, and 3) standard medication follow-up plus a condition designed to control for therapist time and provide environmental changes unrelated to cognitive deficits. Comprehensive assessments

Principes :

Améliorer le fonctionnement adaptatif de la personne :
c-à-d réaliser « les activités simples de la vie
quotidienne »

9 months by raters who were blind to treatment condition.

Results: Significant differences were found between the three treatment groups in levels of psychotic symptoms, motivation, and global functioning at the end of the 9-month study period. Patients in the cognitive adaptation training group overall had higher levels of improvement, compared with those in the remaining treatment conditions. In addition, the three groups had significantly different relapse rates over the 9-month study: 13% for the cognitive adaptation training group, 69% for the group in which therapist time and environmental changes were controlled, and 33% for the group who received standard follow-up only.

Conclusions: Compensatory strategies may improve outcomes for patients with schizophrenia.

(Am J Psychiatry 2000; 157:1317-1323)

Article

Randomized Controlled Trial of the Use of Compensatory Strategies to Enhance Adaptive Functioning in Outpatients With Schizophrenia

Dawn I. Velligan, Ph.D.

C. Christine Bow-Thomas, Ph.D.

Cindy Huntzinger, B.A.

Janice Ritch, M.A.

Natalie Ledbetter, M.A.

Thomas J. Prihoda, Ph.D.

Alexander L. Miller, M.D.

Objective: Cognitive adaptation training is a novel psychosocial treatment approach designed to improve adaptive functioning by using compensatory strategies in the home or work environment to bypass the cognitive deficits associated with schizophrenia. The authors tested the effect of cognitive adaptation training on level of adaptive functioning in outpatients with schizophrenia.

Method: Forty-five patients with DSM-IV schizophrenia or schizoaffective disorder were randomly assigned for 9 months to one of three treatment conditions: 1) standard medication follow-up, 2) standard medication follow-up plus cognitive adaptation training, and 3) standard medication follow-up plus a condition designed to control for therapist time and provide environmental changes unrelated to cognitive deficits. Comprehensive assessments

Principes :

Améliorer le fonctionnement adaptatif de la personne :
c-à-d réaliser « les activités simples de la vie
quotidienne »

la réorganisation de l'environnement permet de
contourner les difficultés cognitives

months by raters who were blind to treatment condition.

Results: Significant differences were found between the three groups in levels of psychotic symptoms, adaptive functioning, and quality of life at the end of the 9-month study period. Patients in the cognitive adaptation training group overall had higher levels of improvement, compared with those in the remaining treatment conditions. In addition, the three groups had significantly different relapse rates over the 9-month study: 13% for the cognitive adaptation training group, 69% for the group in which therapist time and environmental changes were controlled, and 33% for the group who received standard follow-up only.

Conclusions: Compensatory strategies may improve outcomes for patients with schizophrenia.

(Am J Psychiatry 2000; 157:1317-1323)

LES AIDES EXTERNES : COGNITIVE ADAPTATION TRAINING (CAT)

Article

Randomized Controlled Trial of the Use of Compensatory Strategies to Enhance Adaptive Functioning in Outpatients With Schizophrenia

Dawn I. Velligan, Ph.D.

C. Christine Bow-Thomas, Ph.D.

Cindy Huntzinger, B.A.

Janice Ritch, M.A.

Natalie Ledbetter, M.A.

Thomas J. Prihoda, Ph.D.

Alexander L. Miller, M.D.

Objective: Cognitive adaptation training is a novel psychosocial treatment approach designed to improve adaptive functioning by using compensatory strategies in the home or work environment to bypass the cognitive deficits associated with schizophrenia. The authors tested the effect of cognitive adaptation training on level of adaptive functioning in outpatients with schizophrenia.

Method: Forty-five patients with DSM-IV schizophrenia or schizoaffective disorder were randomly assigned for 9 months to one of three treatment conditions: 1) standard medication follow-up, 2) standard medication follow-up plus cognitive adaptation training, and 3) standard medication follow-up plus a condition designed to control for therapist time and provide environmental changes unrelated to cognitive deficits. Comprehensive assessments

Principes :

Améliorer le fonctionnement adaptatif de la personne : c-à-d réaliser « les activités simples de la vie quotidienne »

la réorganisation de l'environnement permet de contourner les difficultés cognitives

Cibles : 3 comportements pbs induits par des déficits exécutifs :

(Am J Psychiatry 2000; 157:1317-1323)

LES AIDES EXTERNES : COGNITIVE ADAPTATION TRAINING (CAT)

Article

Randomized Controlled Trial of the Use of Compensatory Strategies to Enhance Adaptive Functioning in Outpatients With Schizophrenia

Dawn I. Velligan, Ph.D.

C. Christine Bow-Thomas, Ph.D.

Cindy Huntzinger, B.A.

Janice Ritch, M.A.

Natalie Ledbetter, M.A.

Thomas J. Prihoda, Ph.D.

Alexander L. Miller, M.D.

Objective: Cognitive adaptation training is a novel psychosocial treatment approach designed to improve adaptive functioning by using compensatory strategies in the home or work environment to bypass the cognitive deficits associated with schizophrenia. The authors tested the effect of cognitive adaptation training on level of adaptive functioning in outpatients with schizophrenia.

Method: Forty-five patients with DSM-IV schizophrenia or schizoaffective disorder were randomly assigned for 9 months to one of three treatment conditions: 1) standard medication follow-up, 2) standard medication follow-up plus cognitive adaptation training, and 3) standard medication follow-up plus a condition designed to control for therapist time and provide environmental changes unrelated to cognitive deficits. Comprehensive assessments

Principes :

Améliorer le fonctionnement adaptatif de la personne : c-à-d réaliser « les activités simples de la vie quotidienne »

la réorganisation de l'environnement permet de contourner les difficultés cognitives

Cibles : 3 comportements pbs induits par des déficits exécutifs :

- apathie : manque initiation

(Am J Psychiatry 2000; 157:1317-1323)

LES AIDES EXTERNES : COGNITIVE ADAPTATION TRAINING (CAT)

Article

Randomized Controlled Trial of the Use of Compensatory Strategies to Enhance Adaptive Functioning in Outpatients With Schizophrenia

Dawn I. Velligan, Ph.D.

C. Christine Bow-Thomas, Ph.D.

Cindy Huntzinger, B.A.

Janice Ritch, M.A.

Natalie Ledbetter, M.A.

Thomas J. Prihoda, Ph.D.

Alexander L. Miller, M.D.

Objective: Cognitive adaptation training is a novel psychosocial treatment approach designed to improve adaptive functioning by using compensatory strategies in the home or work environment to bypass the cognitive deficits associated with schizophrenia. The authors tested the effect of cognitive adaptation training on level of adaptive functioning in outpatients with schizophrenia.

Method: Forty-five patients with DSM-IV schizophrenia or schizoaffective disorder were randomly assigned for 9 months to one of three treatment conditions: 1) standard medication follow-up, 2) standard medication follow-up plus cognitive adaptation training, and 3) standard medication follow-up plus a condition designed to control for therapist time and provide environmental changes unrelated to cognitive deficits. Comprehensive assessments

Principes :

Améliorer le fonctionnement adaptatif de la personne : c-à-d réaliser « les activités simples de la vie quotidienne »

la réorganisation de l'environnement permet de contourner les difficultés cognitives

Cibles : 3 comportements pbs induits par des déficits exécutifs :

- apathie : manque initiation

- désinhibition : comportement happé par des sources de distraction

(Am J Psychiatry 2000; 157:1317-1323)

LES AIDES EXTERNES : COGNITIVE ADAPTATION TRAINING (CAT)

Article

Randomized Controlled Trial of the Use of Compensatory Strategies to Enhance Adaptive Functioning in Outpatients With Schizophrenia

Dawn I. Velligan, Ph.D.

C. Christine Bow-Thomas, Ph.D.

Cindy Huntzinger, B.A.

Janice Ritch, M.A.

Natalie Ledbetter, M.A.

Thomas J. Prihoda, Ph.D.

Alexander L. Miller, M.D.

Objective: Cognitive adaptation training is a novel psychosocial treatment approach designed to improve adaptive functioning by using compensatory strategies in the home or work environment to bypass the cognitive deficits associated with schizophrenia. The authors tested the effect of cognitive adaptation training on level of adaptive functioning in outpatients with schizophrenia.

Method: Forty-five patients with DSM-IV schizophrenia or schizoaffective disorder were randomly assigned for 9 months to one of three treatment conditions: 1) standard medication follow-up, 2) standard medication follow-up plus cognitive adaptation training, and 3) standard medication follow-up plus a condition designed to control for therapist time and provide environmental changes unrelated to cognitive deficits. Comprehensive assessments

Principes :

Améliorer le fonctionnement adaptatif de la personne : c-à-d réaliser « les activités simples de la vie quotidienne »

la réorganisation de l'environnement permet de contourner les difficultés cognitives

Cibles : 3 comportements pbs induits par des déficits exécutifs :

- apathie : manque initiation

- désinhibition : comportement happé par des sources de distraction

- mixte: difficultés d'initiation + distractibilité

(Am J Psychiatry 2000; 157:1317-1323)

LES AIDES EXTERNES : COGNITIVE ADAPTATION TRAINING (CAT)

Article

Randomized Controlled Trial of the Use of Compensatory Strategies to Enhance Adaptive Functioning in Outpatients With Schizophrenia

Dawn I. Velligan, Ph.D.

C. Christine Bow-Thomas, Ph.D.

Cindy Huntzinger, B.A.

Janice Ritch, M.A.

Natalie Ledbetter, M.A.

Thomas J. Prihoda, Ph.D.

Alexander L. Miller, M.D.

Objective: Cognitive adaptation training is a novel psychosocial treatment approach designed to improve adaptive functioning by using compensatory strategies in the home or work environment to bypass the cognitive deficits associated with schizophrenia. The authors tested the effect of cognitive adaptation training on level of adaptive functioning in outpatients with schizophrenia.

Method: Forty-five patients with DSM-IV schizophrenia or schizoaffective disorder were randomly assigned for 9 months to one of three treatment conditions: 1) standard medication follow-up, 2) standard medication follow-up plus cognitive adaptation training, and 3) standard medication follow-up plus a condition designed to control for therapist time and provide environmental changes unrelated to cognitive deficits. Comprehensive assessments

Principes :

Améliorer le fonctionnement adaptatif de la personne : c-à-d réaliser « les activités simples de la vie quotidienne »

la réorganisation de l'environnement permet de contourner les difficultés cognitives

Cibles : 3 comportements pbs induits par des déficits exécutifs :

- apathie : manque initiation

- désinhibition : comportement happé par des sources de distraction

- mixte: difficultés d'initiation + distractibilité

Travail sur plusieurs activités de la vie quotidienne :

(Am J Psychiatry 2000; 157:1317-1323)

LES AIDES EXTERNES : COGNITIVE ADAPTATION TRAINING (CAT)

Article

Randomized Controlled Trial of the Use of Compensatory Strategies to Enhance Adaptive Functioning in Outpatients With Schizophrenia

Dawn I. Velligan, Ph.D.

C. Christine Bow-Thomas, Ph.D.

Cindy Huntzinger, B.A.

Janice Ritch, M.A.

Natalie Ledbetter, M.A.

Thomas J. Prihoda, Ph.D.

Alexander L. Miller, M.D.

Objective: Cognitive adaptation training is a novel psychosocial treatment approach designed to improve adaptive functioning by using compensatory strategies in the home or work environment to bypass the cognitive deficits associated with schizophrenia. The authors tested the effect of cognitive adaptation training on level of adaptive functioning in outpatients with schizophrenia.

Method: Forty-five patients with DSM-IV schizophrenia or schizoaffective disorder were randomly assigned for 9 months to one of three treatment conditions: 1) standard medication follow-up, 2) standard medication follow-up plus cognitive adaptation training, and 3) standard medication follow-up plus a condition designed to control for therapist time and provide environmental changes unrelated to cognitive deficits. Comprehensive assessments

Principes :

Améliorer le fonctionnement adaptatif de la personne : c-à-d réaliser « les activités simples de la vie quotidienne »

la réorganisation de l'environnement permet de contourner les difficultés cognitives

Cibles : 3 comportements pbs induits par des déficits exécutifs :

- apathie : manque initiation

- désinhibition : comportement happé par des sources de distraction

- mixte: difficultés d'initiation + distractibilité

Travail sur plusieurs activités de la vie quotidienne :

en fonction des l'amplitude des difficultés exécutives

(Am J Psychiatry 2000; 157:1317-1323)

LES AIDES EXTERNES : COGNITIVE ADAPTATION TRAINING (CAT)

Article

Randomized Controlled Trial of the Use of Compensatory Strategies to Enhance Adaptive Functioning in Outpatients With Schizophrenia

Dawn I. Velligan, Ph.D.

C. Christine Bow-Thomas, Ph.D.

Cindy Huntzinger, B.A.

Janice Ritch, M.A.

Natalie Ledbetter, M.A.

Thomas J. Prihoda, Ph.D.

Alexander L. Miller, M.D.

Objective: Cognitive adaptation training is a novel psychosocial treatment approach designed to improve adaptive functioning by using compensatory strategies in the home or work environment to bypass the cognitive deficits associated with schizophrenia. The authors tested the effect of cognitive adaptation training on level of adaptive functioning in outpatients with schizophrenia.

Method: Forty-five patients with DSM-IV schizophrenia or schizoaffective disorder were randomly assigned for 9 months to one of three treatment conditions: 1) standard medication follow-up, 2) standard medication follow-up plus cognitive adaptation training, and 3) standard medication follow-up plus a condition designed to control for therapist time and provide environmental changes unrelated to cognitive deficits. Comprehensive assessments

Principes :

Améliorer le fonctionnement adaptatif de la personne : c-à-d réaliser « les activités simples de la vie quotidienne »

la réorganisation de l'environnement permet de contourner les difficultés cognitives

Cibles : 3 comportements pbs induits par des déficits exécutifs :

- apathie : manque initiation

- désinhibition : comportement happé par des sources de distraction

- mixte: difficultés d'initiation + distractibilité

Travail sur plusieurs activités de la vie quotidienne :

en fonction des l'amplitude des difficultés exécutives

en fonction des 3 comportements problèmes

(Am J Psychiatry 2000; 157:1317-1323)

LES AIDES EXTERNES : COGNITIVE ADAPTATION TRAINING (CAT)

Article

Randomized Controlled Trial of the Use of Compensatory Strategies to Enhance Adaptive Functioning in Outpatients With Schizophrenia

Dawn I. Velligan, Ph.D.

C. Christine Bow-Thomas,

Cindy Huntzinger, B.A.

Janice Ritch, M.A.

Natalie Ledbetter, M.A.

Thomas J. Prihoda, Ph.D.

Alexander L. Miller, M.D.

Objective: Cognitive adaptation training is a novel psychosocial treatment approach that targets executive functioning deficits by raters who were blind to treatment condition.

Principes :

Améliorer le fonctionnement adaptatif de la personne : c-à-d réaliser « les activités simples de la vie quotidienne »

Résultats

- amélioration au niveau de la symptomatologie
- amélioration de la motivation
- amélioration du niveau de fonctionnement
- maintien des effets dans le temps

et permet de

ts par des déficits

par des sources de

(Am J Psychiatry 2000; 157:1317-1323)

- mixte: difficultés d'initiation + distractibilité

Travail sur plusieurs activités de la vie quotidienne :

en fonction des l'amplitude des difficultés exécutives

en fonction des 3 comportements problèmes

LES AIDES EXTERNES : COGNITIVE ADAPTATION TRAINING (CAT)

Research Article

Family-directed cognitive adaptation for schizophrenia

Michelle S. Friedman-Yakoobian , Kim T. Mueser, Anthony Giuliano, Donald C. Goff, Larry J. Seidman

Published in final edited form as:

Am J Psychiatr Rehabil. 2016 ; 19(1): 62–74. doi:10.1080/15487768.2015.1125401.

Family-Directed Cognitive Adaptation Pilot: Teaching Cognitive Adaptation to Families of Individuals with Schizophrenia

Friedman-Yakoobian, Ph.D.¹, Kim T. Mueser, Ph.D.², Anthony J. Giuliano, Ph.D.³, Donald C. Goff, M.D.⁴, and Larry J. Seidman, Ph.D.¹

¹Massachusetts Mental Health Center Public Psychiatry Division of Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA

²Boston University Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston, MA

³Worcester Recovery Center & Hospital, Worcester, MA

⁴New York University Langone Medical Center, New York, NY

Abstract

Cognitive deficits are a major determinant of functional outcome in schizophrenia. A promising treatment involves teaching individuals to use cognitive adaptation strategies to minimize the functional impact of cognitive difficulties. We developed Family Directed Cognitive Adaptation (FCA) to train caregivers to help their relatives with schizophrenia use cognitive adaptations to improve living skills. The goal of this open pilot trial was to examine the feasibility of FCA. Ten adults with schizophrenia, each with at least one relative, participated in FCA and were evaluated at baseline, post-treatment, and 6-month follow-up. Domains assessed included adaptive functioning, psychiatric symptoms, school/work involvement, hospitalizations, family burden, and treatment satisfaction. Participants reported high levels of satisfaction with FCA, and all families completed the 16-session intervention. Relatives reported reduced burden at termination and follow-up. No participants were hospitalized during the treatment or follow-up period, and rates of work/school involvement increased from 30% at baseline to 50% at the end of treatment and follow-up. Individuals improved in negative symptoms and adaptive functioning over the course of treatment, but these gains were not maintained. This pilot provides preliminary support for the acceptability and feasibility of FCA, and points to the need to address the maintenance of treatment gains after termination.

Cognitive Remediation Program for Family Caregivers in Schizophrenia (CIRCUS): Study of the Effectiveness of a Guided AND WEB-BASED Compensatory Cognitive Remediation: A Randomized Pilot Study

Amandine Garbisson (a-garbisson@chu-montpellier.fr)

Hôpital La Colombière: Hopital La Colombiere <https://orcid.org/0000-0002-2830-8272>

Yasmine Laraki

Hôpital La Colombière: Hopital La Colombiere

Tiffany Dubois

Hôpital La Colombière: Hopital La Colombiere

Myrtille André

Hôpital La Colombière: Hopital La Colombiere

Nicolas Rainteau

Hôpital La Colombière: Hopital La Colombiere

Delphine Capdevielle

Hôpital La Colombière: Hopital La Colombiere

Stéphane Raffard

Universite Paul-Valery Montpellier 3

Research Article

Keywords: Schizophrenia, cognitive remediation, family, web-based therapy

Posted Date: July 12th, 2021

DOI: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-561341/v1>

Research Article

Family-directed cognitive adaptation for schizophrenia

Michelle S. Friedman-Yakoobian , Kim T. Mueser, Anthony Giuliano, Donald C. Goff, Larry J. Seidman

Published in final edited form as:

Am J Psychiatr Rehabil. 2016 ; 19(1): 62–74. doi:10.1080/15487768.2015.1125401.

Family-Directed Cognitive Adaptation Pilot: Teaching Cognitive Adaptation to Families of Individuals with Schizophrenia

Friedman-Yakoobian, Ph.D.¹, Kim T. Mueser, Ph.D.², Anthony J. Giuliano, Ph.D.³, Donald C. Goff, M.D.⁴, and Larry J. Seidman, Ph.D.¹

¹Massachusetts Mental Health Center Public Psychiatry Division of Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA

²Boston University Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston, MA

³Worcester Recovery Center & Hospital, Worcester, MA

⁴New York University Langone Medical Center, New York, NY

Abstract

Cognitive deficits are a major determinant of functional outcome in schizophrenia. A promising treatment involves teaching individuals to use cognitive adaptation strategies to minimize the functional impact of cognitive difficulties. We developed Family Directed Cognitive Adaptation (FCA) to train caregivers to help their relatives with schizophrenia use cognitive adaptations to improve living skills. The goal of this open pilot trial was to examine the feasibility of FCA. Ten adults with schizophrenia, each with at least one relative, participated in FCA and were evaluated at baseline, post-treatment, and 6-month follow-up. Domains assessed included adaptive functioning, psychiatric symptoms, school/work involvement, hospitalizations, family burden, and treatment satisfaction. Participants reported high levels of satisfaction with FCA, and all families completed the 16-session intervention. Relatives reported reduced burden at termination and follow-up. No participants were hospitalized during the treatment or follow-up period, and rates of work/school involvement increased from 30% at baseline to 50% at the end of treatment and follow-up. Individuals improved in negative symptoms and adaptive functioning over the course of treatment, but these gains were not maintained. This pilot provides preliminary support for the acceptability and feasibility of FCA, and points to the need to address the maintenance of treatment gains after termination.

Preprints are preliminary reports that have not undergone peer review.
They should not be considered conclusive, used to inform clinical practice,
or referenced by the media as validated information.

Cognitive Remediation Program for Family Caregivers in Schizophrenia (CIRCUS): Study of the Effectiveness of a Guided AND WEB-BASED Compensatory Cognitive Remediation: A Randomized Pilot Study

1	Understanding the signs and symptoms of schizophrenia
2	Executive functioning
3	Developing a plan
4	Getting started with environmental supports
5	Basic strategies for everyday living: Overview, bathing and dressing
6	Basic strategies for everyday living: dental hygiene, applying makeup and using the toilet
7	Basic strategies for everyday living: Keeping the home clean and tidy
8	Basic strategies for everyday living: Healthy eating and cooking
9	Basic strategies for everyday living: Doing laundry and managing medication
10	Strategies that go beyond the basics: Overview, grocery shopping and transportation
11	Strategies that go beyond the basics: Managing money
12	Strategies that go beyond the basics: Social skills, communication and leisure skills
13	Strategies that go beyond the basics: Works skills
14	Putting supports into practice

LES AIDES EXTERNES : UN EXEMPLE

Présentation cas avec mise en place aide externe M-H.

plainte de difficultés de lecture et difficultés de concentration

contexte : personne active, diagnostic fibromyalgie

LES AIDES EXTERNES : UN EXEMPLE

Présentation cas avec mise en place aide externe M-H.

plainte de difficultés de lecture et difficultés de concentration

contexte : personne active, diagnostic fibromyalgie

Bilan neuropsychy :

manque de structuration
des informations
concentration fluctuante
difficultés en mémoire de
travail

bonnes capacités
neurocognitives par
ailleurs

LES AIDES EXTERNES : UN EXEMPLE

Présentation cas avec mise en place aide externe M-H.

plainte de difficultés de lecture et difficultés de concentration

contexte : personne active, diagnostic fibromyalgie

Bilan neuropsychy :

manque de structuration
des informations
concentration fluctuante
difficultés en mémoire de
travail

bonnes capacités
neurocognitives par
ailleurs

Incapacité :

ne peut plus lire de romans
ne s'occupe pas des
papiers administratifs
a du mal avec les
instructions pour son cours
de solfège
aider son fils aux devoirs

LES AIDES EXTERNES : UN EXEMPLE

Présentation cas avec mise en place aide externe M-H.

plainte de difficultés de lecture et difficultés de concentration

contexte : personne active, diagnostic fibromyalgie

Bilan neuropsychy :

manque de structuration
des informations
concentration fluctuante
difficultés en mémoire de
travail

bonnes capacités
neurocognitives par
ailleurs

Incapacité :

ne peut plus lire de romans
ne s'occupe pas des
papiers administratifs
a du mal avec les
instructions pour son cours
de solfège
aider son fils aux devoirs

Handicap :

sentiment de culpabilité
retrait lors des interactions
sociales
conflits avec son fils

LES AIDES EXTERNES : UN EXEMPLE

Son besoin le plus important : pouvoir lire à nouveau des romans et pouvoir en parler avec son fils

lire un livre : est-ce simple ? quelle(s) fonction(s) cognitive(s) sont impliquée(s) ?

Son besoin le plus
parler avec son fils

lire un livre : est-

et pouvoir en

nt impliquée(s) ?

LES AIDES EXTERNES : UN EXEMPLE

LES AIDES EXTERNES : UN EXEMPLE

Son besoin le plus important : pouvoir lire à nouveau des romans et pouvoir en parler avec son fils

LES AIDES EXTERNES : UN EXEMPLE

Son besoin le plus important : pouvoir lire à nouveau des romans et pouvoir en parler avec son fils

Contexte : fatigue, humeur stable

LES AIDES EXTERNES : UN EXEMPLE

Son besoin le plus important : pouvoir lire à nouveau des romans et pouvoir en parler avec son fils

Contexte : fatigue, humeur stable

Spécification du pb pour lire des romans :

Son besoin le plus important : pouvoir lire à nouveau des romans et pouvoir en parler avec son fils

Contexte : fatigue, humeur stable

Spécification du pb pour lire des romans :

- format visuel : taille police, espacement interligne...?

Son besoin le plus important : pouvoir lire à nouveau des romans et pouvoir en parler avec son fils

Contexte : fatigue, humeur stable

Spécification du pb pour lire des romans :

- format visuel : taille police, espacement interligne...?
- oubli de toutes les informations au fur et à mesure ou des informations spécifiques ?

Son besoin le plus important : pouvoir lire à nouveau des romans et pouvoir en parler avec son fils

Contexte : fatigue, humeur stable

Spécification du pb pour lire des romans :

- format visuel : taille police, espacement interligne...?
- oubli de toutes les informations au fur et à mesure ou des informations spécifiques ?
- variables associées (fatigue subjective lors de la lecture, distractibilité...)

LES AIDES EXTERNES : UN EXEMPLE

Pb cible :

Pb cible :

les difficultés de mémoire de travail et notamment de mise à jour se répercutaient spécifiquement sur la mémorisation des personnages

Pb cible :

les difficultés de mémoire de travail et notamment de mise à jour se répercutaient spécifiquement sur la mémorisation des personnages

effet visuel de la densité des paragraphes

Pb cible :

les difficultés de mémoire de travail et notamment de mise à jour se répercutaient spécifiquement sur la mémorisation des personnages

effet visuel de la densité des paragraphes

Procédure d'implémentation d'aides externes :

Pb cible :

les difficultés de mémoire de travail et notamment de mise à jour se répercutaient spécifiquement sur la mémorisation des personnages

effet visuel de la densité des paragraphes

Procédure d'implémentation d'aides externes :

lignes de base : quantifie le cpt pb cible et prend en compte des variables connexes

Pb cible :

les difficultés de mémoire de travail et notamment de mise à jour se répercutaient spécifiquement sur la mémorisation des personnages

effet visuel de la densité des paragraphes

Procédure d'implémentation d'aides externes :

lignes de base : quantifie le cpt pb cible et prend en compte des variables connexes

psychoéducation des pbs de mémoire de travail

Pb cible :

les difficultés de mémoire de travail et notamment de mise à jour se répercutaient spécifiquement sur la mémorisation des personnages

effet visuel de la densité des paragraphes

Procédure d'implémentation d'aides externes :

lignes de base : quantifie le cpt pb cible et prend en compte des variables connexes

psychoéducation des pbs de mémoire de travail

apprentissage à l'utilisation d'une aide externe créée et adaptée à la lecture de romans par la personne

Pb cible :

les difficultés de mémoire de travail et notamment de mise à jour se répercutaient spécifiquement sur la mémorisation des personnages

effet visuel de la densité des paragraphes

Procédure d'implémentation d'aides externes :

lignes de base : quantifie le cpt pb cible et prend en compte des variables connexes

psychoéducation des pbs de mémoire de travail

apprentissage à l'utilisation d'une aide externe créée et adaptée à la lecture de romans par la personne

- fiche lecture interactive (choix faisant suite à l'essai de 3 versions différentes)

Pb cible :

les difficultés de mémoire de travail et notamment de mise à jour se répercutaient spécifiquement sur la mémorisation des personnages

effet visuel de la densité des paragraphes

Procédure d'implémentation d'aides externes :

lignes de base : quantifie le cpt pb cible et prend en compte des variables connexes

psychoéducation des pbs de mémoire de travail

apprentissage à l'utilisation d'une aide externe créée et adaptée à la lecture de romans par la personne

- fiche lecture interactive (choix faisant suite à l'essai de 3 versions différentes)
- cache visuel + feutres de couleurs

Pb cible :

les difficultés de mémoire de travail et notamment de mise à jour se répercutaient spécifiquement sur la mémorisation des personnages

effet visuel de la densité des paragraphes

Procédure d'implémentation d'aides externes :

lignes de base : quantifie le cpt pb cible et prend en compte des variables connexes

psychoéducation des pbs de mémoire de travail

apprentissage à l'utilisation d'une aide externe créée et adaptée à la lecture de romans par la personne

- fiche lecture interactive (choix faisant suite à l'essai de 3 versions différentes)
- cache visuel + feutres de couleurs

10 sessions d'entraînement

Pb cible :

les difficultés de mémoire de travail répercutaient spécifiquement sur la lecture de textes longs en raison de l'effet visuel de la densité des paragraphes.

Procédure d'implémentation d'aide

lignes de base : quantifie le cpt pb connexes

psychoéducation des pbs de mém

apprentissage à l'utilisation d'une aide externe créée et adaptée à la lecture de romans par la personne

- fiche lecture interactive (choix faisant suite à l'essai de 3 versions différentes)
- cache visuel + feutres de couleurs

10 sessions d'entraînement

Pb cible :

les difficultés de mémoire de travail répercutaient spécifiquement sur la lecture
l'effet visuel de la densité des paragraphes

Procédure d'implémentation d'aides

lignes de base : quantifie le cpt de mots
connexes

psychoéducation des pbs de mémoire

apprentissage à l'utilisation d'outils
de romans par la personne

- fiche lecture interactive (choix de questions différentes)
- cache visuel + feutres de couleur

10 sessions d'entraînement

LES AIDES EXTERNES : UN EXEMPLE

LES AIDES EXTERNES : UN EXEMPLE

Handicap

- reprise de la lecture d'un roman facile appartenant à son fils +
- partage de la lecture du livre avec son fils +
- achat de la série dont est issu le livre

PARTIE 2. UN PEU DE PRATIQUE

CONSIGNES

4 tables :

soit 1 cas pour deux tables soit 1 cas pour les 4 avec un besoin différent pour chaque table

instructions :

pendant 15 min : trouver une aide qui permet de répondre au mieux au(x) besoin(s) de la personne

Pour essayez de réfléchir à la procédure d'apprentissage à l'utilisation de l'aide

15 min : debrief et mise en commun

VIGNETTE 1

BAC pro validé

diagnostic psy : trouble personnalité borderline, trouble délirant chronique en lien avec une polyaddiction

consommation de toxiques : alcool actuellement

somatique/neurologique :

porphyrie aiguë intermittente

épilepsie non stabilisée

hypokaliémie chronique

IRM : démyélinisation supratentorielle de bas grade hypersignal démyélinisant de la face interne du noyau thalamique gauche

trophicité hippocampique SCHELTENS 1

pb visuels

	Faiblesses	Forces
Attention	<ul style="list-style-type: none"> - concentration - focaliser son - attention sans se laisser distraire - orientation attention : papillon 	réactivité sur des info précédées d'une alarme sonore
fonctions exécutives	<ul style="list-style-type: none"> - jongler entre deux activités mentales 	flexibilité spontanée : faire preuve d'initiative
Mémoire	<p>mémoire de travail :</p> <ul style="list-style-type: none"> - charge mentale - mettre à jour les informations en mémoire 	capacités mémoire immédiate intacte mémoire à long-terme
Langage		fluide

Incapacités :

ne peut plus regarder des films

Handicap :

dévalorisation +++

isolement

peur de sortir

Incapacités :

ne peux plus lire

Handicap :

dévalorisation +++

isolement

peur de sortir

Incapacités :

ne parvient pas à retrouver le chemin pour aller chez son médecin

Handicap :

dévalorisation +++

isolement

peur de sortir

Incapacités :

Retenir ce qui est dit pendant les conversations

Handicap :

dévalorisation +++

isolement

peur de sortir